

VAN DRIL TOT KIKKER

3




De bruine kikker is een van de eerste kikkers die in het voorjaar aan de voortplanting begint. De buik van **moederkikker** zit vol eitjes. Vaderkikker omhelst moeder terwijl zij haar eitjes legt. **Vaderkikker** laat tegelijk zijn zaadcellen los,



Een kikkerleven begint als een kleine zwarte stip.

waarmee hij de eitjes bevrucht. Een moederkikker kan wel vierduizend eitjes leggen. In kikkerdril zit voedsel voor de dikkopjes.



De **kikkervisjes** zijn de larven van de kikker.

De stip is het ei. Daar rond zit een soort gelei. Die gelei beschermt het ei tegen schokken. Zodra het ei in het water gelegd wordt, zwelt de gelei op. De gelei beschermt het ei.

De kikkerdril wordt warm in de zon. Hoe lang het duurt voordat de kikkervisjes uit de eitjes komen, hangt af van de temperatuur in het vroege voorjaar.




Het duurt een hele dag voor een dikkopje uit zijn eitje raakt. Nadat de dikkopjes uitgekomen zijn, rusten ze een paar minuten en zwemmen dan weg. Dikkopjes kunnen onder water ademen.

Dat komt door hun kieuwen. Na vier weken zijn de kieuwen van het dikkopje bedekt met huid, de longen beginnen te groeien. De meeste dikkopjes worden al opgegeten voor ze volwassen zijn.




Bruine kikker

- Paart vroeg in het voorjaar.
- Hij kwaakt niet, maar knort.




Groene kikker

- Kan groen zijn, maar ook zwart of donkerblauw.
- Heeft een lichte streep over zijn rug.



- Paart pas in mei of nog later.
- Kwaakt zeer luid met opgezette wangen: de kwaakblazen.


Ze lijken veel op kikkers, maar zijn toch anders : **PADDEN**.



Gewone pad

- Springt niet maar loopt.
- Paart vroeg in het voorjaar.

- Heeft geurklieren op zijn rug.



Rugstreeppad

- Heeft een lichte streep over zijn rug.
- Leeft voornamelijk op het droge zand.